

QU'EST-CE QUE C'EST ?

La chirurgie orthognatique est une branche de la chirurgie maxillo-faciale.

Elle permet de corriger certains déséquilibres entre les mâchoires, lorsque ceux-ci sont trop importants pour être traités uniquement par l'orthodontie, notamment lorsque la croissance est terminée et qu'il n'est plus possible d'agir par orthopédie.

Avant tout traitement, un bilan très complet sera effectué, ainsi que différentes radiographies et empreintes dentaires. L'occlusion dentaire (fermeture de la mâchoire) sera évaluée. Les différentes fonctions seront étudiées et l'impact esthétique analysé.

L'intervention peut concerner l'une des mâchoires ou bien les deux. Une fois posée la nécessité de l'intervention, l'orthodontiste et le chirurgien maxillo-facial prépareront le plan de traitement ensemble.

INTÉRÊT DE LA CHIRURGIE

La Chirurgie orthognatique corrige les anomalies de position des mâchoires : la malocclusion et améliore les fonctions telles que la mastication, la respiration, la phonation etc.

Elle est indiquée lorsque l'orthodontie seule ne suffit pas à corriger ces déséquilibres.

Les principales anomalies corrigées :

- Le prognathisme (mâchoire inférieure trop avancée)
- Le rétrognathisme (dents du haut sont trop en avant, menton fuyant et mâchoire du bas trop en arrière)
- Béance dentaire
- Asymétrie



LES ÉTAPES DU TRAITEMENT

En première phase de traitement nous allons aligner les dents parfaitement sur vos mâchoires supérieure et inférieure avec un appareil orthodontique. Des empreintes numériques seront réalisées pour contrôler si les mâchoires sont prêtes pour la chirurgie ; A ce moment-là, l'intervention chirurgicale permettra d'emboîter les mâchoires l'une dans l'autre.

Nous réaliserons ensuite un travail de finitions orthodontiques pour parfaire l'emboîtement des dents.

L'intervention se déroule sous anesthésie générale au bloc opératoire.

COMMENT SE PASSE LA CHIRURGIE ?

Vous serez hospitalisé la veille de l'opération et jusqu'à 48 à 72h après l'intervention. Après l'opération, vos mâchoires seront maintenues avec des élastiques fixés sur votre appareil orthodontique. Les jours suivants vous risquez de gonfler et d'être fatigué, concernant l'alimentation il faudra privilégier les aliments mixés pendant environ 6 semaines.

L'APPAREIL D'ORTHODONTIE EST DONC MIS EN PLACE AVANT L'INTERVENTION, LAISSÉ EN PLACE PENDANT LA CHIRURGIE ET ENLEVÉ QUELQUES MOIS APRÈS L'OPÉRATION, UNE FOIS LA CICATRISATION ET L'EMBOITEMENT DES DENTS OBTENUS.

BON A SAVOIR !

Aucune cicatrice n'est visible car l'incision est réalisée dans la bouche. Les plaques mises en place par le chirurgien peuvent être laissées à vie.

Les résultats sont immédiatement visibles mais ne seront définitifs qu'après 6 mois, le temps que l'œdème disparaisse complètement.



@DRTABET_CABINETORTHO

- 31 bis rue Barla 06300 NICE
- Téléphone : 04.92.27.13.30
- Orthodontie.tabet@gmail.com
- www.docteur-tabet@gmail.com
- Notre plus belle couleur : votre sourire !



CABINET D'ORTHODONTIE

Docteur Caroline TABET

CHIRURGIE ORTHOGNATIQUE & ORTHODONTIQUE



Votre coopération est notre plus bel atout !