

L'APPAREIL D'ORTHODONTIE EST DONC MIS EN PLACE AVANT L'INTERVENTION, LAISSÉ EN PLACE PENDANT LA CHIRURGIE ET ENLEVÉ QUELQUES MOIS APRÈS, UNE FOIS LA CICATRISATION ET L'EMBOÎTEMENT DES DENTS OBTENUS.

Il peut parfois être nécessaire de réaliser une première intervention chirurgicale avant la pose de l'appareil d'orthodontie.

SACHEZ QUE



Aucune cicatrice n'est visible car l'incision est réalisée dans la bouche. Les plaques mises en place par le chirurgien peuvent être laissées à vie. Les résultats sont immédiatement visibles mais ne seront définitifs qu'après 6 mois, le temps que l'œdème disparaisse complètement.

**NOUS FORMONS UNE VÉRITABLE ÉQUIPE.
SI NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE,
LES RÉSULTATS SERONT AU RENDEZ-VOUS,
ET LE TRAITEMENT SERA BEAUCOUP PLUS COURT.**

- 31 Bis Rue Barla, 06300 Nice
- Téléphone: 04.92.27.13.30
- orthodontie.tabet@gmail.com
- www.docteur-tabet-caroline.chirurgiens-dentistes.fr
- Notre plus belle couleur : **votre sourire !**



CLINIQUE D'ORTHODONTIE
Docteur Caroline TABET

CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE ET ORTHODONTIE



**VOTRE COOPÉRATION EST NOTRE PLUS BEL ATOUT !
PAR AVANCE MERCI POUR VOTRE AIDE.**

La chirurgie orthognatique a pour but de corriger la position ou la forme des mâchoires dont la croissance ne s'est pas faite correctement.

Le plus souvent, c'est le problème de « dents trop en avant » qui est mis en évidence par le patient. Il est parfois possible dans une certaine limite de corriger un décalage de mâchoire chez l'adulte en modifiant la position des dents. Mais dans certains cas, le décalage de mâchoire est trop important et il ne sera pas possible à l'orthodontiste d'agir seul : il travaillera en équipe avec un chirurgien maxillo-facial.

Le chirurgien maxillo-facial va agir sur les os de la mâchoire supérieure et inférieure. Le but est de normaliser la position des mâchoires pour pouvoir corriger le problème d'alignement et d'emboîtement des dents.



BUT DE LA CHIRURGIE ORTHOGNATIQUE

Elle va permettre de repositionner correctement les mâchoires pour pouvoir corriger la position des dents.

La modification de la position des mâchoires va transformer la morphologie du visage et de ses tissus. Chaque patient est différent et la chirurgie va s'adapter à chacun d'entre eux.

COMMENT SE PASSE LA CHIRURGIE ?

Cette intervention se déroule sous anesthésie générale au bloc opératoire. Vous resterez hospitalisé quelques jours. Vous serez hospitalisé généralement la veille, et ressortirez 48 à 72 heures après.

Après l'opération, vos mâchoires seront maintenues avec des élastiques fixés sur votre appareil orthodontique. Les jours suivants vous risquez de gonfler, vous serez fatigué et vous devrez privilégier pendant 6 semaines des aliments mixés.

Il faudra veiller à bien suivre les conseils postopératoires de votre chirurgien et de votre orthodontiste.

QUAND A-T-ELLE LIEU ?

L'orthodontiste va évaluer la nécessité d'une intervention chirurgicale après votre examen clinique, l'examen de vos photographies, de vos radiographies et de vos moulages (votre dossier de traitement). Vos fonctions (respiration, phonation) seront également étudiées.

Après vous avoir expliqué la nécessité de l'intervention chirurgicale, il vous orientera vers des chirurgiens Maxillo-faciaux pour une première consultation.

Ainsi vous aurez rencontré tous les intervenants de votre traitement, les explications vous auront été données pour que vous soyez éclairé dans votre décision.

Nous allons alors déterminer un projet de traitement.

LES ÉTAPES DU TRAITEMENT

L'intervention chirurgicale se déroule pendant le traitement d'orthodontie : nous allons aligner vos dents parfaitement sur vos mâchoires supérieure et inférieure, puis l'intervention va permettre d'emboîter les mâchoires l'une dans l'autre. Nous réaliserons ensuite un travail de finitions orthodontiques pour parfaire l'emboîtement des dents.